



La surveillance continue des manifestations cliniques indésirables (MCI) est essentielle afin d'assurer la surveillance de l'innocuité des vaccins et de maintenir la confiance à l'égard des programmes de vaccination.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des MCI signalées en Ontario à la suite de l'administration de vaccins en 2019.



Les taux de signalement de MCI variaient considérablement d'un bureau de santé publique (BSP) à l'autre allant de 0,8 à 29,7 pour 100 000 personnes.



## Types de manifestations indésirables

La plupart des manifestations indésirables étaient bénignes.

Parmi les MCI qui ont été signalées, les réactions les plus fréquentes étaient les suivantes :



**39%** de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au point d'injection



**25%** une éruption cutanée



**14%** une manifestation allergique cutanée

## Répartition selon l'âge et le sexe

L'âge des personnes qui ont fait l'objet d'un signalement de MCI variait de 1 mois à 98 ans, l'âge médian étant de 31 ans. Les taux de signalement les plus élevés de MCI ont été observés **chez les nourrissons de moins d'un an et les enfants âgés d'un à trois ans**.



**Nourrissons de moins d'un an :**  
28,6 pour 100 000 personnes



**Enfants âgés d'un à trois ans :**  
28,1 pour 100 000 personnes



**Une prédominance des femmes a été constatée dans les signalements de MCI**



**64%** des MCI sont survenues chez des femmes

## Vaccins

Les **taux les plus élevés de signalements de MCI** selon les doses de vaccins distribuées (à l'aide des fonds publics) ont été observés comme suit :



Bien que le vaccin antigrippal ait été associé au **plus grand nombre de signalements de MCI** (228), il se classait au **second rang** (5,8 pour 100 000 doses distribuées) en raison du volume élevé de doses distribuées pour ce vaccin.



Le vaccin recombinant contre le zona (VRZ) représentait **13 %** des signalements de MCI.

La réaction la plus fréquemment signalée associée au VRZ était **la douleur, la rougeur ou l'enflure au point d'injection** (59 %).

## Source des signalements



**Les médecins et les autres fournisseurs de soins de santé ont signalé la majorité des MCI (69 %).**

Les signalements par des membres de la famille et les autosignalements représentaient 24 % des signalements de MCI.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'outil de surveillance de l'innocuité des vaccins à l'adresse suivante:  
[publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety](http://publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety)