

Question 1

On vous informe que M^{me} Trottier doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Placer sur la porte une affiche de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse, au besoin.
- C. Porter des gants afin de fournir des soins directs.
- D. Porter des gants et une blouse lorsque vous trouvez près du lit.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Observer le patient durant 24 heures afin de voir si ses symptômes respiratoires disparaissent avant d'établir les précautions.
- B. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- C. Attendre de recevoir des résultats positifs du laboratoire avant d'établir les précautions.
- D. Cesser les précautions à la demande du professionnel chargé du contrôle des infections ou du médecin.

Question 3

M^{me} Morose présente les signes et les symptômes d'une infection gastro-intestinale. Elle occupe une chambre pour deux personnes. Quelles stratégies permettraient de prévenir la transmission possible d'agents infectieux?

Répondez en indiquant un crochet « ✓ » dans la ou les cases appropriées.

- A. Déplacer M^{me} Morose dans une chambre pour une personne, s'il y en a une de disponible.
- B. Déterminer quel résident utilisera la toilette et celui qui utilisera le siège d'aisance.
- C. Garder la porte fermée.
- D. Transférer M^{me} Morose à l'hôpital.

Question 4

M^{me} Goutte fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) devez-vous porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire
Évaluer les bruits thoraciques de M ^{me} Goutte.	✓	✓	✓	✓
Vider la poubelle qui se trouve dans la chambre près de la porte d'entrée.		✓		
Retirer le plateau de repas qui se trouve sur la table de chevet de M ^{me} Goutte.			✓	✓

Question 5

M^{me} Pluie fait l'objet de précautions contre les contacts en raison des sécrétions d'une plaie infectée. Son état se détériore et elle doit être transférée à l'hôpital. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le centre d'autorisation de transfert des patients que M^{me} Pluie fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M^{me} Pluie à monter sur la civière de l'ambulance.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M^{me} Pluie afin d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant son inscription.

Commentaires supplémentaires

Question 1

Lorsqu'un patient fait l'objet de précautions contre les contacts, une affiche doit être placée à la porte ou près du lit du patient. Portez des gants et une blouse afin de fournir des soins directs.

Question 2

Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts doivent être établies dès que les symptômes sont déterminés. N'attendez pas les résultats du laboratoire. Cesser les précautions uniquement à la demande du professionnel en prévention des infections ou du médecin.

Question 3

Une chambre pour personne seule serait idéalement le meilleur type de chambre, mais ce type de chambre n'est pas toujours disponible. Demander à un résident d'utiliser la toilette et à l'autre d'utiliser un siège d'aisance contribue à réduire le risque de transmission d'agents infectieux. Il n'est pas nécessaire de garder la porte fermée puisqu'il ne s'agit pas d'une stratégie de prévention de la transmission d'une infection gastro-intestinale. Il n'est pas nécessaire de transférer M^{me} Glum à l'hôpital, à moins que son état ne se détériore.

Question 4

Lorsque vous évaluez les bruits thoraciques de M^{me} Goutte, vous devez porter une blouse, des gants, un masque et une protection oculaire afin de protéger votre visage, votre uniforme ou vos vêtements et vos mains parce que vous fournissez des soins directs et que vous vous trouvez à moins de deux mètres de M^{me} Goutte. Cela permet de réduire le risque de transmission d'agents infectieux.

Lorsque vous videz une poubelle, vous devez suivre les pratiques de base et porter des gants. Il n'est pas nécessaire de protéger votre visage parce que vous vous trouvez à plus de deux mètres de M^{me} Goutte. Vous n'avez pas non plus à porter une blouse parce que vous ne fournissez pas de soins directs.

Vous serez à moins de deux mètres de M^{me} Goutte pour retirer son plateau de repas. Vous devez donc porter un masque et une protection oculaire même si dans ce cas vous ne fournissez pas de soins directs.

Question 5

Il est important de communiquer avec les autres fournisseurs de services ou établissements lorsque des précautions supplémentaires sont requises. Aider M^{me} Pluie à monter sur la civière constitue un contact direct. Vous devez donc porter une blouse et des gants. Lorsque vous parlez à M^{me} Pluie, vous ne fournissez pas de soins directs, il n'est donc pas nécessaire de porter de l'ÉPI. Nettoyez-vous toujours les mains conformément aux quatre étapes.