

Habitudes de consommation de médicaments et de soins de santé chez les personnes décédées d'une intoxication liée aux opioïdes pendant la pandémie de COVID-19 en Ontario

La pandémie de COVID-19 a suscité une augmentation notable des décès accidentels ou involontaires liés aux opioïdes. Comprendre les habitudes de consommation de soins de santé des personnes décédées d'une intoxication liée aux opioïdes pendant la pandémie peut aider à mieux cerner les possibilités de soutien et de prévention.


Périodes étudiées

Avant la pandémie (de mars à décembre 2019)
1,017 décès liés aux opioïdes

Durant la pandémie (de mars à décembre 2020)
1,808 décès liés aux opioïdes

Caractéristiques démographiques

Taux de décès liés aux opioïdes pendant la pandémie:




Implication des opioïdes

De plus en plus, les décès n'impliquent que des opioïdes d'usage non médical provenant de marchés non réglementés



Pendant la pandémie, seulement



La méthadone était l'opioïde de qualité pharmaceutique le plus souvent associé au décès. Parmi ces décès:



L'hydromorphone a directement contribué à un nombre similaire de décès d'une période à l'autre de la pandémie, mais ce nombre est passé de



Implication d'autres drogues



5X plus de **benzodiazépines d'usage non médical** détectés dans les décès liés aux opioïdes



L'étizolam (une benzodiazépine d'usage non médical non prescrit au Canada) compte pour plus de **90%** de ces décès

Consultations récentes en santé

Le recours aux services de santé chez les personnes à risque de surdose est élevé, mais il a diminué pendant la pandémie



2/3 des décès touchaient des personnes qui avaient déjà consulté pour un **trouble de consommation d'opioïdes (TCO)**

Seulement **1/3** des personnes décédées avaient eu accès à une **thérapie aux agonistes opioïdes** au cours des 5 dernières années, et **1/10** au cours des 30 derniers jours

89% des personnes décédées avaient consulté pour un **trouble de santé mentale** (y compris un TCO) dans les 5 dernières années

Il y a eu une hausse notable des personnes ayant déjà consulté pour des **troubles psychotiques** pendant la pandémie

1/4 des personnes avaient des antécédents de **douleur chronique**

2/3 d'entre elles avaient aussi consulté pour un **TCO**

Analyse ciblée: personnes en situation d'itinérance

La pandémie a eu un impact disproportionné chez les personnes en situation d'itinérance

2X plus de décès chez les personnes en situation d'itinérance

121 avant la pandémie à **293** pendant la pandémie

1/6 des personnes décédées pendant la pandémie étaient en situation d'itinérance

1/4 avaient été vues par un fournisseur de santé dans les **7 jours** précédant leur décès Plus précisément:

Au cours des 5 dernières années:

14% avaient été vues en **consultation externe**

5% avaient été vues en **soins primaires**

10% avaient été vues aux **urgences**

3/4 avaient reçu des soins liés à un **TCO**

93% avaient été vues pour un **trouble de santé mentale**



Pour en savoir plus

