

Cours de formation en présentiel sur la PCI pour les travailleurs de la santé dans les établissements de soins de longue durée

Module 3 : Précautions supplémentaires en PCI

Notes de cours des formateurs (ERPS)

Diapositive 1

Public
Health
Ontario

Santé
publique
Ontario

Cours de formation en présentiel sur la PCI pour les travailleurs de la santé dans les établissements de soins de longue durée

Module 3 : Précautions supplémentaires en PCI

Diapositive 2

Avis de non-responsabilité

Ce module d'apprentissage a été élaboré par Santé publique Ontario (SPO). SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes actuellement disponibles. SPO décline toute responsabilité quant aux résultats de l'utilisation de ce module d'apprentissage par quiconque. Ce module d'apprentissage peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement et sous réserve de mention de la source, à savoir Santé publique Ontario. **Aucune modification ne peut être apportée à ce module d'apprentissage sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.**

Diapositive 3

Aperçu du cours

Ce cours comporte quatre modules qui abordent les points essentiels de la prévention et du contrôle des infections (PCI) et offre des occasions de les mettre en pratique.

- Les modules 1 à 3 comprennent :
 - des diapositives
 - des activités pratiques
- Le module 4 comprend :
 - des scénarios pratiques et des questions à choix multiples
 - un quiz final

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Ce cours est conçu pour initier les travailleurs de la santé aux compétences essentielles en prévention et en contrôle des infections (PCI). Il s'agit des compétences et des connaissances de base que tous les travailleurs de la santé de l'Ontario doivent comprendre et mettre en pratique. Ce cours vous aidera à approfondir vos connaissances sur les principes de PCI et à acquérir des compétences que vous pourrez appliquer à votre travail.

Ce cours comprend quatre modules principaux. Les trois premiers modules couvrent les concepts fondamentaux applicables à divers milieux, tandis que le quatrième porte spécifiquement sur les établissements de soins de longue durée. Dans ce module, vous aurez l'occasion de répéter l'application de ces principes à des scénarios établissements de soins de longue durée réalistes. Une fois les quatre modules terminés, vous pourrez passer un quiz final pour démontrer vos connaissances.

Une note de 80 % est requise pour réussir à cet quiz, mais vous pourrez le repasser si nécessaire. Un certificat d'achèvement vous sera remis lorsque vous aurez passé le quiz final avec succès.

Diapositive 4

Diapositive 5

Aperçu des modules

- Module 1 : Introduction à la PCI et aux pratiques de base
 - Chaîne de transmission et évaluations du risque au point de service
 - Équipement de protection individuelle (EPI)
- Module 2 : Fondements des pratiques de base
 - Hygiène des mains
 - Contrôles environnementaux
 - Programmes de santé et de sécurité au travail
- **Module 3 : Précautions supplémentaires en PCI**
- Module 4 : Application des principes de PCI dans les établissements de soins de longue durée

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Voici un aperçu des quatre modules. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le module 3. Ce module traite de l'emploi approprié de précautions supplémentaires pour les résidents chez lesquels une infection transmissible est soupçonnée ou confirmée.

Diapositive 6

Objectifs d'apprentissage

À la fin du module, vous devriez pouvoir faire ce qui suit :

- Définir les précautions supplémentaires et expliquer l'importance de les utiliser dans certaines situations en milieu de soins.
- Décrire les différents modes de transmission des agents infectieux et leurs liens avec différentes catégories de précautions supplémentaires.
- Appliquer les précautions supplémentaires qui conviennent à une situation.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : À la fin du module, vous devriez pouvoir faire ce qui suit : Définir les précautions supplémentaires et expliquer l'importance de les utiliser dans certaines situations en milieu de soins. Décrire les différents modes de transmission des agents infectieux et leurs liens avec différentes catégories de précautions supplémentaires. Appliquer les précautions supplémentaires qui conviennent à une situation.

Instructions aux formateurs : Reportez-vous au module 3 : Précautions supplémentaires en matière de PCI dans le Guide du formateur pour en savoir plus. Cette section comprend des instructions pour les exercices pratiques facultatifs qui peuvent être utilisés pour renforcer l'apprentissage de votre auditoire.

Diapositive 7

Les précautions supplémentaires

Mesures de PCI employées dans les foyers de soins de longue durée pour gérer les cas d'infection par des agents infectieux connus ou soupçonnés. Elles sont différentes des pratiques de base.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Des mesures de PCI utilisées dans les milieux de soins pour gérer les cas d'infection par certains agents infectieux connus ou soupçonnés. Rappelez-vous qu'elles sont différentes des pratiques de base que nous avons vues dans les modules 1 et 2 de ce cours. Voici des exemples d'éléments de précautions supplémentaires :

- Des avis spéciaux sont affichés à l'extérieur des chambres de certains résidents.
- Les travailleurs de la santé portent un EPI particulier avant d'entrer dans la chambre de certains résidents.
- Il y a des types particuliers d'EPI et de fournitures à l'extérieur des chambres de certains résidents.
- Le dossier médical de certains résidents contient des alertes ou des avis spéciaux.

Diapositive 8

Modes de transmission

Comment les agents infectieux se déplacent pour propager les infections.

Voici des exemples de modes de transmission :

- Transmission par contact
- Transmission par voie aérienne



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Si vous vous rappelez bien, nous avons appris au module 1 que l'un des six maillons de la propagation d'une infection est la capacité de l'agent infectieux de se déplacer d'un endroit à un autre. Les agents infectieux se déplacent de différentes façons qui sont appelées modes de transmission. Il s'agit du quatrième maillon de la chaîne de transmission.

Voici des exemples de modes de transmission :

- Transmission par contact
- Transmission par voie aérienne

Diapositive 9

Transmission par contact

Il existe deux types de transmission par contact :

- La transmission par contact direct se fait par le toucher.
- P. ex., le transfert direct d'un agent infectieux entre une source colonisée ou infectée et un hôte réceptif.
- La transmission par contact indirect se fait au contact d'équipement ou de surfaces contaminés.
- P. ex., les mains contaminées d'un travailleur de la santé transmettant des agents infectieux d'un résident colonisé à un hôte réceptif.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Il existe deux types de transmission par contact : La transmission par contact direct se produit lorsqu'il y a un transfert direct de l'agent infectieux entre une source colonisée ou infectée et un hôte réceptif. La transmission par contact indirect se produit lorsqu'il y a contact entre de l'équipement, des surfaces ou des sources contaminées, y compris les mains contaminées de fournisseurs de soins de santé, et un hôte réceptif. Exemples d'agents infectieux pouvant être transmis par contact :

- Norovirus
- Organismes résistants aux antibiotiques, dont les suivants :
- Staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SDRM)
- *Candida auris*
- Entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)

Diapositive 10

Transmission par l'air

- Les particules d'infections respiratoires sont transportées dans l'air et pénètrent l'organisme d'un hôte réceptif par les moyens suivants :
 - En se déposant sur les muqueuses (p. ex. yeux, nez, bouche) d'une autre personne.
 - En accédant aux voies respiratoires par inhalation.
- Exemples d'agents infectieux pouvant être transmis de cette manière :
 - Virus de la grippe
 - SARS-CoV-2 (virus causant la COVID-19)
 - *Neisseria meningitidis* (bactérie causant la méningite bactérienne)
 - Streptocoque du groupe A (bactérie pouvant causer la pharyngite à streptocoque et la pneumonie)

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Les particules d'infections respiratoires sont transportées dans l'air et pénètrent l'organisme d'un hôte réceptif par les moyens suivants :

- en se déposant sur les muqueuses (p. ex. yeux, nez, bouche) d'une autre personne.
- en accédant aux voies respiratoires par inhalation.

Exemples d'agents infectieux pouvant être transmis de cette manière :

- Virus de la grippe
- SARS-CoV-2 (virus causant la COVID-19)
- *Neisseria meningitidis* (bactérie causant la méningite bactérienne)
- Streptocoque du groupe A (bactérie pouvant causer la pharyngite à streptocoque et la pneumonie)

Diapositive 11

Transmission par voie aérienne

- Lors de la transmission par voie aérienne, les particules respiratoires infectieuses peuvent demeurer suspendues dans l'air pendant des périodes prolongées et se déplacer dans les courants d'air sur de plus longues distances.
- Exemples d'agents infectieux transmis par voie aérienne :
 - *Mycobacterium tuberculosis*
 - Virus varicelle-zona (p. ex. varicelle et zona disséminé)
 - Virus de la rougeole



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Lors de la transmission par voie aérienne, les particules respiratoires infectieuses peuvent demeurer suspendues dans l'air pendant des périodes prolongées et se déplacer dans les courants d'air sur de plus longues distances. Exemples d'agents infectieux transmis par voie aérienne : *Mycobacterium tuberculosis*, Virus varicelle-zona (p. ex. varicelle et zona disséminé), Virus de la rougeole.

Diapositive 12

Types de précautions supplémentaires

La catégorie de précautions supplémentaires à appliquer est basée sur les modes de transmission des possibles agents infectieux en cause. Voici différents types de précautions supplémentaires :

- Précautions contre les contacts
- Précautions contre l'exposition aux gouttelettes
- Les précautions supplémentaires en cas d'infections aiguës des voies respiratoires sont aussi appelées précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes
- Précautions contre la transmission par voie aérienne


Notes de cours des formateurs (ERPS) : La catégorie de précautions supplémentaires à appliquer est basée sur les modes de transmission des possibles agents infectieux en cause. Voici différents types de précautions supplémentaires : précautions contre les contacts, précautions contre l'exposition aux gouttelettes, les précautions supplémentaires en cas d'infections aiguës des voies respiratoires sont aussi appelées précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes, précautions contre la transmission par voie aérienne.

Diapositive 13

Précautions contre les contacts

Utilisées lorsqu'un agent infectieux se transmet par contact direct ou indirect. Lorsqu'un résident est visé par des précautions contre les contacts, les travailleurs de la santé doivent :

- Porter des gants.
- Porter une blouse à manches longues durant toutes les activités qui impliquent un contact entre votre peau ou vos vêtements et le résident et son environnement.
- Utiliser l'équipement uniquement avec le résident ou nettoyer et désinfecter l'équipement avant toute utilisation avec un autre résident.



Trainer speaker notes : Les **précautions contre les contacts** sont utilisées lorsqu'un agent infectieux se transmet par contact direct ou indirect. Lorsqu'un résident est visé par des précautions contre les contacts, les travailleurs de la santé doivent :

- Porter des gants.
- Porter une blouse à manches longues durant toutes les activités qui impliquent un contact entre votre peau ou vos vêtements et le résident et son environnement.
- Utiliser l'équipement uniquement avec le résident ou nettoyer et désinfecter l'équipement avant toute utilisation avec un autre résident.

Diapositive 14

Précautions contre l'exposition aux gouttelettes

Nécessaires lorsque des particules infectieuses s'échappent des voies respiratoires et pénètrent dans les yeux, le nez ou la bouche d'un hôte réceptif. Les travailleurs de la santé doivent :

- Pratiquer l'hygiène des mains avant de mettre l'ÉPI.
- Porter un masque médical et des lunettes de protection à une distance de deux mètres ou moins d'un résident.
- Utiliser l'équipement uniquement avec le résident ou désinfecter l'équipement avant toute utilisation avec un autre résident.
- Demander au résident de porter un masque médical dès qu'il quitte sa chambre.

Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes sont souvent couplées avec des précautions contre les contacts.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes sont employées lorsque des particules infectieuses sortent des voies respiratoires et pénètrent dans les yeux, le nez ou la bouche d'une autre personne. Les travailleurs de la santé doivent :

- Pratiquer l'hygiène des mains avant de mettre l'ÉPI.
Porter un masque médical et des lunettes de protection à une distance de deux mètres ou moins d'un résident.
- Utiliser l'équipement uniquement avec le résident ou désinfecter l'équipement avant toute utilisation avec un autre résident.
- Demander au résident de porter un masque médical dès qu'il quitte sa chambre.

Diapositive 15

Les précautions supplémentaires en cas d'infections aiguës des voies respiratoires

Nécessaires lorsque des particules respiratoires infectieuses se propagent dans l'air sur de courtes distances en se posant directement sur les muqueuses. Aussi appelées précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes. Le travailleur de la santé doit :

- Porter un masque médical (ou un respirateur N95, selon les résultats de l'ERPS), et une protection oculaire à une distance de deux mètres ou moins du résident.
- Porter des gants et une blouse.
- Soit utiliser l'équipement uniquement avec le résident, soit nettoyer et désinfecter l'équipement avant toute utilisation avec un autre résident.
- Demander au résident de porter un masque médical (s'il tolère le masque) dès qu'il quitte sa chambre.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Les précautions supplémentaires en cas d'infections aiguës des voies respiratoires sont aussi appelées précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes. Lorsqu'un résident nécessite des précautions supplémentaires contre les infections respiratoires aiguës, le travailleur de la santé doit, en plus de pratiquer l'hygiène des mains, porter un masque médical (ou un respirateur N95 selon le résultat de l'ERPS) et une protection oculaire à une distance de deux mètres ou moins du résident. Il doit également porter des gants et une blouse lors d'un contact avec le résident ou son environnement et, soit utiliser l'équipement uniquement avec le résident, soit nettoyer et désinfecter l'équipement avant son utilisation avec un autre résident. Demander au résident de porter un masque médical (s'il tolère le masque) dès qu'il quitte sa chambre.

Diapositive 16

Précautions contre la transmission par voie aérienne

Nécessaires lorsque les particules infectieuses des voies respiratoires se transmettent par voie aérienne. Le travailleur de la santé doit :

- Installer le résident dans une chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA).
- Porter un respirateur N95 dont l'ajustement et l'étanchéité ont été vérifiés.
- Déplacer le résident le moins possible et lui demander de porter un masque médical (s'il tolère le masque).
- Le travailleur de la santé doit porter un respirateur N95 durant le transport.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Des précautions contre la transmission par voie aérienne sont prises lorsque les particules infectieuses des voies respiratoires se transmettent par voie aérienne. Lorsqu'un résident nécessite des précautions contre les infections transmises par voie aérienne, le travailleur de la santé doit, en plus de pratiquer l'hygiène des mains, installer le résident dans une chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA) ou, si ce n'est pas possible, dans une chambre individuelle avec porte fermée, porter un respirateur N95 dont l'ajustement et l'étanchéité ont été vérifiés, déplacer le résident le moins possible et lui demander de porter un masque médical (s'il tolère le masque) lors des déplacements; le travailleur de la santé doit porter un respirateur N95 durant les déplacements.

Diapositive 17

Combinaison de précautions supplémentaires

- Il peut être nécessaire de prendre plus d'un type de précautions supplémentaires dans les cas suivants :
 - Un agent infectieux à l'origine d'une infection a plus d'un mode de transmission.
 - Un résident est colonisé ou infecté par plus d'un agent infectieux ayant différents modes de transmission.
- Lorsque vous avez recours à une combinaison de précautions supplémentaires, utilisez tous les éléments de chaque type de précautions.
- *Le streptocoque invasif du groupe A*, par exemple, nécessite des précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes.
- Les précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes exigent le port d'un masque médical, d'une protection oculaire, de gants et d'une blouse à manches longues.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Certaines circonstances exigent de prendre plus d'un type de précautions supplémentaires. Il arrive que différents types de précautions supplémentaires soient nécessaires lorsque plusieurs modes de transmission sont en cause pour un agent infectieux en particulier. Il se peut qu'un résident soit atteint de deux infections en même temps ou soit colonisé par un agent infectieux et infecté simultanément par un autre agent. Dans ce genre de situation, il faut prendre des précautions supplémentaires appropriées pour chaque agent infectieux. Lorsqu'on a recours à une combinaison de précautions, il faut appliquer tous les éléments de chaque type de précautions. Le streptocoque invasif du groupe A est un exemple d'agent infectieux qui nécessite des précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes. Lorsqu'ils fournissent des soins à un résident nécessitant des précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes, les travailleurs de la santé doivent porter un masque médical, une protection oculaire, des gants et une blouse à manches longues. Quel que soit le type de précautions supplémentaires appliqué, les visiteurs devraient toujours consulter le personnel avant d'interagir avec un résident visé par ces précautions ou de pénétrer dans son environnement. Le personnel est tenu d'informer les visiteurs sur l'importance de l'hygiène des mains et l'utilisation d'EPI. Peu importe le type de précautions supplémentaires mis en place, il faut continuer d'appliquer les pratiques de base.

Diapositive 18

Le virus de la rougeole

- Le virus de la rougeole est un exemple d'agent infectieux qui nécessite des précautions contre la transmission par voie aérienne, les contacts et l'exposition aux gouttelettes.
- Seul le personnel ayant une preuve présumée d'immunité contre la rougeole peut traiter les cas suspectés ou confirmés de rougeole.
- Il faut un respirateur N95 dont l'ajustement et l'étanchéité ont été vérifiés, une protection oculaire, des gants et une blouse au moment d'entrer dans la chambre ou de prodiguer des soins au résident.
- Veuillez consulter les plus récentes directives à ce sujet.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Le virus de la rougeole est un autre exemple d'agent infectieux qui nécessite différents types de précautions supplémentaires. Il exige des précautions contre la transmission par voie aérienne, les contacts et l'exposition aux gouttelettes. En ce qui concerne la rougeole, seul le personnel ayant une preuve présumée d'immunité contre la rougeole peut traiter les cas suspectés ou confirmés de rougeole. De plus, il faut un respirateur N95 dont l'ajustement et l'étanchéité ont été vérifiés, ainsi qu'une protection oculaire, des gants et une blouse au moment d'entrer dans la chambre ou de prodiguer des soins au résident. **Veuillez consulter les plus récentes directives à ce sujet.**

Diapositive 19

Éléments des précautions supplémentaires

- Voici des éléments de précautions supplémentaires :
 - hébergement
 - affichage particulier
 - utilisation d'EPI
 - nettoyage et désinfection
 - d'équipement médicaux
 - communication
 - transport de résidents
 - présence de visiteurs
- Si le résident nécessite des précautions supplémentaires, il faut en informer chaque personne appelée à interagir avec lui ou à lui prodiguer des soins.
- L'équipement et les fournitures nécessaires doivent être fournis.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Nous avons déjà parlé de l'utilisation d'EPI liée aux précautions supplémentaires, mais qu'en est-il des autres éléments? Voici certains éléments également nécessaires à l'application de précautions supplémentaires pour un résident :

- Hébergement
- utilisation de dispositifs et d'équipement médicaux
- affichage particulier
- Communication
- utilisation d'EPI
- transport de résidents
- nettoyage et désinfection
- considérations à prendre en compte en présence de visiteurs

Si le résident nécessite des précautions supplémentaires, il faut en informer chaque personne appelée à interagir avec lui ou à lui prodiguer des soins. L'équipement et les fournitures nécessaires doivent être fournis. Examinons-les de plus près.

Diapositive 20

Hébergement

- Les résidents visés par des précautions supplémentaires doivent être installés en priorité dans une chambre individuelle dotée de ses propres installations sanitaires pour les séparer des autres personnes à risque d'infection.
- Si une chambre doit être partagée, tout doit être fait pour séparer les résidents afin d'assurer une sorte d'isolement, notamment :
 - Tirer le rideau dans une chambre à plusieurs lits;
 - Réserver une salle de bain pour un résident et fournir une chaise d'aisance aux autres.
- Dans le cas des infections transmises par voie aérienne, comme la varicelle et la tuberculose, le placement dans une chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA) est nécessaire.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Les résidents visés par des précautions supplémentaires doivent être installés dans une aire désignée ou une chambre individuelle dès leur arrivée pour les tenir à l'écart des autres personnes à risque d'infection. Cette mesure doit être prise dès l'identification des symptômes, sans attendre la confirmation de l'infection par un test diagnostique. Les foyers de soins de longue durée ne disposent peut-être pas de chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA) et il peut être impossible de déplacer un résident étant donné que sa chambre représente son lieu de vie et qu'il peut être difficile de les déplacer. Il faut déployer tous les efforts possibles pour assurer une forme de séparation. Il peut s'agir d'éloigner le résident ou client des autres jusqu'à son rendez-vous. S'il a une infection des voies respiratoires, il faut lui demander de porter un masque médical, s'il le tolère, et de pratiquer l'hygiène des mains pendant qu'il attend d'être vu. Les infections transmises par voie aérienne, comme la varicelle et la tuberculose, nécessitent le placement dans une chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA).

Remarque : Les CIIA sont conçues, construites et ventilées de manière à limiter la propagation des micro-organismes aéroportés d'un résident ou client infecté aux zones environnantes du milieu de soins. On appelle aussi ces chambres des chambres à pression négative. La circulation d'air est conçue pour que l'air du corridor soit dirigé vers la chambre, empêchant les agents infectieux aéroportés de sortir.

Diapositive 21

Diapositive 22

Affichage

Les affiches et les indications servent à informer les autres personnes qu'un résident nécessite des précautions supplémentaires. Pour assurer une bonne communication, posez des affiches à l'entrée des salles d'examen ou des chambres des résidents ou résidents et ajoutez des indications dans leur dossier.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Les affiches et les indications servent à informer les autres personnes qu'un résident nécessite des précautions supplémentaires. Pour assurer une bonne communication, posez des affiches à l'entrée des salles d'examen ou des chambres des résidents ou résidents et ajoutez des indications dans leur dossier.

Diapositive 23

ÉPI

- Selon le mode de transmission de l'agent infectieux en cause, des types d'EPI particuliers pourraient être requis.
- Le type d'EPI à utiliser dépend du type de précautions supplémentaires.
- Peu importe le type de précautions supplémentaires, il faut continuer d'appliquer les pratiques de base.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Selon le mode de transmission de l'agent infectieux en cause, des types d'équipement de protection individuelle (ÉPI) spécifiques pourraient être requis dans le cadre des précautions supplémentaires. La Leçon 1 du module fournit des exemples des types d'ÉPI à utiliser en fonction des précautions supplémentaires qui sont en place. Peu importe le type de précautions supplémentaires mises en place, il faut continuer d'appliquer les pratiques de base, y compris l'utilisation adéquate de l'ÉPI. Pour passer en revue les pratiques de base associées à l'utilisation d'ÉPI, consultez le Module 1 : Introduction à la PCI et aux pratiques de base.

Diapositive 24

Nettoyage de l'environnement

- Certains types de précautions supplémentaires nécessitent une procédure de nettoyage et de désinfection additionnelle ou plus en profondeur.
- *Le Clostridioides difficile (C. difficile)* nécessite des précautions contre la transmission par contact et une procédure spéciale de nettoyage de l'environnement à l'aide de nettoyeurs et d'agents désinfectants précis.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Des mesures de nettoyage additionnelles ou plus en profondeur pourraient être nécessaires pour certains types de précautions supplémentaires. Le *C. difficile* forme des spores et nécessite l'emploi d'un sporicide pour les éliminer ou les rendre inactifs.

Diapositive 25

Équipement

- Tout équipement partagé entre des résidents doit être nettoyé et désinfecté.
- Dans le cas d'un résident visé par des précautions supplémentaires, il est préférable de ne pas partager l'équipement et de le réserver pour son traitement.
- Il est particulièrement important de ne pas partager l'équipement lorsque les précautions supplémentaires nécessitent des méthodes spéciales de nettoyage et de désinfection.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Rappelez-vous que les pratiques de base prévoient le nettoyage et la désinfection de tout équipement partagé entre des résidents. Dans le cas d'une personne visée par des précautions supplémentaires, il est préférable de ne pas partager l'équipement et de le réserver pour son traitement. Cela est particulièrement indiqué pour les personnes visées par des précautions supplémentaires en raison d'infections nécessitant des méthodes spéciales de nettoyage et de désinfection.

Diapositive 26

Communication

- Expliquez à vos résidents pourquoi on met en place des précautions supplémentaires.
- Si un résident fait l'objet de précautions supplémentaires, il faut en informer les visiteurs et leur indiquer comment réduire leur risque d'exposition et utiliser l'EPI en toute sécurité.
- Assurez vous que les autres services ou établissements concernés et les services de transport (p. ex., les porteurs) sont au courant des précautions supplémentaires à prendre.
- Le respect des précautions supplémentaires n'exige pas la divulgation de renseignements personnels sur la santé, car le type de précautions supplémentaires requises pour prévenir l'infection est la seule information qui doit être communiquée.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Il est important d'expliquer à vos résidents pourquoi on met en place des précautions supplémentaires. Il faut aussi aviser les visiteurs qu'un résident fait l'objet de précautions supplémentaires et les informer sur les façons de réduire leur risque d'exposition et sur l'utilisation sécuritaire de l'ÉPI. Assurez-vous que les autres services ou établissements concernés et les services de transport (p. ex. les porteurs) sont au courant des précautions supplémentaires à prendre. Veuillez noter que vous n'avez pas à divulguer de renseignements médicaux personnels pour l'application des précautions supplémentaires. Vous n'avez qu'à informer les personnes concernées du type de précautions à prendre pour prévenir l'infection.

Diapositive 27

Questions de discussion sur la communication des précautions supplémentaires

1. Vous souvenez vous d'une situation où il y a eu un problème de communication entre les services et où des précautions supplémentaires n'ont pas été prises?
2. Votre lieu de travail a-t-il une stratégie pour remédier à ce genre de situation?



Instructions pour les formateurs : cette question peut être utilisée pour une discussion en groupe nombreux, en petit groupe ou en binôme.

Commentaires du formateur : La discussion peut s'articuler autour des stratégies pour communiquer la nécessité de mettre en place des précautions supplémentaires (p. ex., affiches sur les portes, alertes dans les dossiers médicaux, etc.). Des stratégies pour améliorer la communication peuvent également être soumises à la discussion si des exemples de mauvaise communication peuvent être partagés.

Diapositive 28

Transport

- Évitez de transporter un résident visé par des précautions supplémentaires dans l'Établissements de soins de longue durée sauf si c'est nécessaire.
- Si un transport est nécessaire, le personnel chargé du transport (p. ex., les porteurs) devra peut être porter de l'EPI.
- La blouse et les gants sont utilisés uniquement lors des contacts directs (p. ex., en aidant le résident à s'installer dans son fauteuil roulant ou sur une civière), mais pas durant le transport.
- On ne porte pas de gants pour éviter de contaminer les surfaces souvent touchées (p. ex., poignées de porte, boutons d'ascenseur).
- Si un masque médical est requis, le personnel des services de transport doit le porter pendant toute la durée de l'interaction.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Si le résident doit se déplacer, le personnel des services de transport (p. ex., les porteurs) devra peut-être porter de l'EPI. En général, la blouse et les gants sont utilisés uniquement lors des contacts directs (p. ex., en aidant la personne à s'installer dans son fauteuil roulant ou sur une civière), mais pas durant le transport. Lorsqu'on pousse un fauteuil roulant, on ne porte pas de gants pour éviter de contaminer les surfaces souvent touchées (p. ex., poignées de porte, boutons d'ascenseur) durant le transport. Si un masque médical est requis, le personnel des services de transport doit le porter pendant toute la durée de l'interaction.

Diapositive 29

Visiteurs

Il est recommandé de consulter les politiques internes concernant les visiteurs, car elles peuvent varier selon les organisations. Si les visiteurs sont autorisés, on devra peut-être les informer sur la façon de mettre ou d'enlever l'ÉPI et de pratiquer l'hygiène des mains.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Il est recommandé de consulter les politiques internes concernant les visiteurs, car elles peuvent varier selon les organisations. Si les visiteurs sont autorisés, on devra peut-être les informer sur la façon de mettre ou d'enlever l'ÉPI et de pratiquer l'hygiène des mains. En gardant à l'esprit les divers aspects des précautions supplémentaires, nous allons maintenant passer en revue certains facteurs clés à prendre en compte pour amorcer, maintenir et mettre fin aux précautions supplémentaires.

Diapositive 30

Mise en place des précautions supplémentaires

- N'importe quel membre d'une profession de la santé réglementée (p. ex., une infirmière autorisée, une infirmière praticienne autorisée) ou un professionnel de la PCI désigné peut mettre en place des précautions supplémentaires.
- Prévoyez des précautions supplémentaires dès que des signes ou symptômes apparaissent.
- N'attendez pas qu'une infection soit diagnostiquée.
- Prenez en considération les politiques spécifiques de votre foyers de soins de longue durée.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : N'importe quel membre d'une profession de la santé réglementée tel qu'une infirmière autorisée, une infirmière praticienne autorisée ou un professionnel de la PCI désigné peut mettre en place des précautions supplémentaires. La personne responsable de la PCI dans votre milieu de soins doit être avisée dès la mise en place de précautions supplémentaires. Elle vérifiera la pertinence des précautions et continuera à évaluer la situation et à faire des recommandations. Prévoyez des précautions supplémentaires dès que des signes ou symptômes apparaissent. N'attendez pas qu'une infection soit diagnostiquée. Vous pouvez toujours ajuster les précautions supplémentaires et les suspendre si nécessaire, lorsque vous aurez plus d'informations. La décision d'attendre de recevoir des résultats de laboratoire confirmant un diagnostic d'infection avant de mettre en œuvre des précautions supplémentaires pourrait entraîner l'exposition à des infections et des écloptions. De plus, suivez les politiques spécifiques de votre foyers de soins de longue durée concernant la mise en place de précautions supplémentaires.

Diapositive 31

Ces scénarios nécessitent-ils des précautions supplémentaires?



Un résident se blesse au dos en faisant une chute



Une résidente présente une forte fièvre accompagnée de toux et d'un mal de gorge



Un résident se sent faible et a besoin d'aide pour marcher

Instructions aux formateurs :

- Un résident se blesse au dos en faisant une chute : En l'absence de signes ou de symptômes d'infection, le résident qui s'est blessé au dos en faisant une chute n'aurait pas besoin de précautions supplémentaires. Les pratiques de base suffisent.
- Une résidente présente une forte fièvre accompagnée de toux et d'un mal de gorge : Une résidente qui a une forte fièvre accompagnée de toux et d'un mal de gorge présente des signes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et aurait donc besoin de précautions supplémentaires. En raison de la possibilité que cette résidente souffre d'une IRA, des précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes seraient nécessaires.
- Un résident se sent faible et a besoin d'aide pour marcher : S'il n'y a pas d'autres signes ou symptômes, aucune précaution supplémentaire n'est requise et les pratiques habituelles suffisent.
- (Facultatif) Un résident montre des signes de déshydratation après deux jours de nausées, de vomissements et de diarrhée : Les nausées, les vomissements et la diarrhée indiquent une infection gastro-intestinale probable. Des précautions contre les contacts sont donc nécessaires.
- (Facultatif) Un nouveau résident signale de lui-même des antécédents de colonisation par un organisme résistant aux antimicrobiens tel que le *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) : Les résidents qui sont colonisés par le SARM requièrent des précautions contre les contacts. Des mesures doivent être prises pour confirmer le statut de ce résident en ce qui concerne le SARM.
- (Facultatif) : Un résident reçoit un diagnostic d'infection urinaire : À moins que l'infection urinaire ne soit causée par un organisme résistant aux antimicrobiens, aucune précaution supplémentaire n'est requise dans le cas d'une infection urinaire. Les pratiques de base suffisent.

Diapositive 32

Questions de discussion sur la mise en place de précautions supplémentaires

1. Pensez à une situation où vous ne saviez pas quelles précautions supplémentaires prendre. Comment avez-vous résolu le problème?
2. Avez-vous eu de la difficulté à mettre en œuvre des précautions supplémentaires? Dans l'affirmative, comment avez-vous géré la situation?



SantepubliqueOntario.ca

30

Instructions aux formateurs : Cette question peut être utilisée pour une discussion en groupe nombreux, en petit groupe ou en binôme.

Commentaires du formateur : La discussion peut porter sur les situations où il a été difficile de prendre des précautions supplémentaires ou de déterminer quelles précautions supplémentaires étaient nécessaires (p. ex., les signes ou symptômes d'infection n'étaient pas évidents). D'autres difficultés, telles que la communication des précautions supplémentaires ou le non-respect des consignes par le personnel, la famille ou les visiteurs, pourraient également être abordées.

Diapositive 33

Maintien des précautions supplémentaires

- Maintenez les précautions supplémentaires aussi longtemps que nécessaire.
- Veillez à ce que les fournitures et l'équipement requis pour chaque élément des précautions supplémentaires soient facilement accessibles.
- Les précautions supplémentaires sont maintenues jusqu'à ce qu'un médecin, un professionnel de la PCI ou une personne désignée révise la situation et prenne la décision de les suspendre.
- Les révisions régulières par un professionnel de la PCI permettent de s'assurer que les précautions supplémentaires sont en place aussi longtemps qu'il faut.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Nous allons maintenant examiner certaines considérations concernant le maintien des précautions supplémentaires. Maintenez les précautions supplémentaires aussi longtemps que nécessaire. Veillez à ce que les fournitures et l'équipement requis pour chaque élément des précautions supplémentaires soient facilement accessibles. Les précautions supplémentaires sont maintenues jusqu'à ce qu'un médecin, un professionnel de la PCI ou une personne désignée révise la situation et prenne la décision de les suspendre. Les révisions régulières par un professionnel de la PCI permettent de s'assurer que les précautions supplémentaires sont en place aussi longtemps qu'il faut.

Diapositive 34

Suspension des précautions supplémentaires

- La décision de suspendre les précautions supplémentaires est basée sur :
 - les politiques de votre organisation.
 - les résultats de laboratoire.
 - le diagnostic.
- La suspension des précautions supplémentaires :
 - peut entrer en vigueur dès que le risque de transmission disparaît.
 - doit être conforme aux politiques de l'foyers de soins de longue durée.
 - décrétée par le responsable de la PCI ou une personne désignée.
 - peut nécessiter une discussion avec le médecin traitant.

Notes de cours des formateurs (ERPS) : Il y a quelques considérations à prendre en compte lors de la suspension des précautions supplémentaires. Tout d'abord, examinez les politiques organisationnelles relatives à la suspension des précautions supplémentaires afin de vous assurer de suivre le processus approprié. Les résultats de laboratoire peuvent influencer la décision et le diagnostic final. Les précautions supplémentaires peuvent cesser dès que le risque de transmission disparaît. Pour revenir aux politiques, assurez-vous qu'elles sont respectées et que le professionnel de la PCI ou la personne désignée confirme et communique la nécessité de suspendre les précautions supplémentaires. Il peut parfois être nécessaire de consulter un médecin afin de s'assurer que les critères de levée des précautions sont bien remplis.

Diapositive 35

Résumé

Les sujets que nous avons abordés dans ce module :

- Il existe différentes catégories de précautions supplémentaires à prendre dans différentes situations.
- Les précautions supplémentaires comportent divers éléments qui sont combinés aux pratiques de base pour prévenir et contenir la transmission d'agents infectieux.
- Les précautions supplémentaires sont mises en place et levées selon des critères établis et après consultation de professionnels de la PCI.



Notes de cours des formateurs (ERPS) : Ceci nous amène à la fin de ce module du cours. Les sujets que nous avons abordés dans ce module : Il existe différentes catégories de précautions supplémentaires à prendre dans différentes situations. Les précautions supplémentaires comportent divers éléments qui sont combinés aux pratiques de base pour prévenir et contenir la transmission d'agents infectieux. Les précautions supplémentaires sont mises en place et levées selon des critères établis et après consultation de professionnels de la PCI.

Santé publique Ontario

661, Av. University, bureau 1701

Toronto (Ontario)

M5G 1M1

(416) 235-6556

communications@oahpp.ca

santepubliqueontario.ca

