

? Je pense qu'un résident a une infection des voies urinaires (IVU)

Évaluer le résident
Est-ce que la personne présente?

Signes et symptômes cliniques d'une IVU

Miction soudainement difficile ou douloureuse (dysurie aiguë)

Ou

Au moins deux des éléments suivants :

- Fièvre (température buccale supérieure à 37,9 °C ou 1,5 °C au-dessus de la température de référence à deux occasions consécutives dans une période de 12 heures)
- Nouvelle douleur au flanc ou douleur/sensibilité sus-pubienne
- Mictions soudainement impérieuses ou plus fréquentes
- Hématurie macroscopique

Oui

Encourager et surveiller, évaluer et discuter

- **Discuter** avec le médecin ou l'infirmier(ière) prat.
- **Obtenir une culture d'urine.** Si une antibiothérapie empirique est prescrite, recueillir un échantillon d'urine pour culture et antibiogramme avant le début de l'antibiothérapie.
- L'échantillon peut être prélevé en milieu de jet ou par cathéter.

NON

Symptômes non spécifiques uniquement

- Détérioration de l'état fonctionnel
- Détérioration de l'état mental (p. ex., nouveaux changements de comportement, plus grande confusion, délire aigu ou agitation)
- Une chute ne devrait pas être considérée comme un signe d'infection

Oui

Encourager et surveiller, évaluer et discuter

1. **Encourager** (sauf en cas de contre-indications cliniques) **et surveiller** la consommation accrue de liquides durant les 24 heures suivantes.
2. **Évaluer** si le résident souffre de constipation et s'il y a d'autres causes au changement de comportement.
3. **Discuter d'un suivi** avec le médecin ou l'infirmier(ière) praticien(ne)

Réévaluer les signes et symptômes d'infection urinaire après 24 heures

Oui

Apparition de symptômes

Non

Revoir les résultats de la culture d'urine :

- Numération bactérienne > 10⁸ UFC/L, avec signes et symptômes d'une IVU.
- Plus de deux (2) organismes différents indiquent une contamination

Réévaluer les signes et symptômes du résident :

- Consulter son médecin ou son infirmier(ière) praticien(ne) au sujet des résultats de la culture d'urine et de l'état du résident.

- **Aucun prélèvement d'urine nécessaire.**
- **Aucun traitement requis.**
- **Chercher à établir la cause des symptômes non spécifiques.**

Cet outil fait partie du programme sur les IVU de Santé publique Ontario. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.publichealthontario.ca/fr/IVU ou par courriel ipac@oahpp.ca.