

Programme IVU

Comment interpréter un rapport de culture d'urine



Une numération bactérienne équivalente ou supérieure à 10^8 UFC/L accompagnée de signes et symptômes habituellement associés à une IVU est considérée comme significative.



Le médecin ou l'infirmier praticien/l'infirmière praticienne devrait réévaluer la nécessité d'un traitement antimicrobien, la sensibilité antimicrobienne, la voie et la durée du traitement en fonction des résultats du rapport de culture d'urine.



La présence de plus de deux organismes n'est pas significative et indique plutôt une contamination probable de l'échantillon.

Méthodes de prélèvement d'un échantillon d'urine

**Méthodes adéquates de prélèvement d'un échantillon d'urine pour culture^a**

Prélèvement en milieu de jet | à l'aide d'un cathéter

^aLe respect rigoureux de la technique aseptique est essentiel pour garantir l'intégrité de la qualité de l'échantillon d'urine

**Méthodes inadéquates de prélèvement d'un échantillon d'urine pour culture^b**

Condom collecteur | À partir d'une serviette hygiénique bleue ou d'une couche-culotte
À partir d'un urinoir, d'un bassin de lit ou d'un récipient collecteur

^bCes méthodes entraînent la contamination des échantillons et sont inacceptables